

台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心97年上半年特殊中毒案例報告



主講人：台北榮總內科部臨床毒物科 蔡維禎醫師、楊振昌醫師

97/10/07

台北榮民總醫院是國內少數設有臨床毒物科的醫學中心，同時在行政院衛生署支持下附設全國唯一提供24小時全天候服務的毒藥物諮詢暨解毒劑管控中心；協助提供各類中毒病患之診斷及治療諮詢、轉診服務、解毒劑供應、中毒事件之調查、中毒標本之鑑定、及中毒物質之檢驗分析(涵蓋：藥物、濫用物質、毒品、農藥、重金屬、中藥添加西藥、甲苯及代謝物、甲醇、氰化物等)。本次記者會中將報告97年度上半年臺北榮總毒藥物諮詢中心處理或協助處理之特殊中毒個案。

國內首例併用搖頭丸及神仙水導致急性肝腎衰竭的中毒案例

30餘歲男性患者，於數月前為娛樂目的而同時使用搖頭丸(MDMA)及神仙水(GHB)，並於使用後當日即因中毒導致昏迷、橫紋肌溶解症、肝功能異常、及腎衰竭。病患經他院轉送至臺北榮總後，病況仍持續惡化，經治療二個月左右，才順利出院；但出院後仍產生呼吸不適之後遺症。

搖頭丸(MDMA)屬二級毒品，為國內常見的俱樂部毒品。口服後約20-60分鐘開始作用，作用通常持續4-6小時。搖頭丸中毒的症狀，一般而言雖不嚴重，可能僅有焦慮、躁動、高血壓、脈搏加速、瞳孔放大、肌肉痙攣、牙關緊咬、手抖、及冒汗。但部份病患可能產生嚴重中毒症狀，包括大於40°C的高燒、低血壓、休克、心律不整、心臟衰竭、橫紋肌溶解症、代謝性酸血症、肺水腫、腦水腫、中風、抽搐、昏迷、肝腎衰竭、凝血異常、及猝死。

至於神仙水(GHB)亦屬二級毒品，也是國內常見的俱樂部毒品。GHB口服後約5-30分鐘即會產生作用，作用時間約4小時。GHB進入人體後，會影響腦部的多種傳導物質，產生欣快感、昏睡、頭痛、暈眩、嘔吐、失憶、視幻覺、脈搏變慢、瞳孔縮小、低體溫、肌抽躍、及呼吸抑制。嚴重中毒時，則可能產生脈搏過慢、痙攣性肌肉收縮、神智不清、譫妄、抽搐、昏迷、嚴重呼吸抑制、肝衰竭、電解質異常、低血壓、及吸入性肺炎。中毒病患可能因昏迷及嘔吐、或是呼吸道阻塞而死亡。

誤食綠摺菇 夫妻險喪命 食用野生蕈類需小心

第二個案例則是一起於雨後因誤用野生蕈類導致中毒的事件。病患共夫妻二人，於97年5月底於嘉義住處附近自行摘取類似「雞肉絲菇」之野生菇回家煮湯食用，先生於服食半小時後產生劇烈腹痛、噁心、即嚴重嘔吐，經送醫治療後無大礙。太太同樣於食用半小時後產生腹痛、噁心，但未嘔吐。太太於就醫數小時後突發抽搐、昏迷及嚴重之代謝性酸血症，經急救後終於恢復正常。兩人服用之野生蕈類經送請專家鑑定後，確認係綠摺菇(chlorophyllum molybdites)。

綠摺菇蕈蓋為白色傘形，中央略突起，邊緣不規則，蓋頂有易脫落的褐色鱗片，容易與可以食用的雞肉絲菇(*Termitomyces albuminosus*)混淆。綠摺菇中毒後約30分鐘至2小時會產生中毒症狀，主要為噁心、嘔吐、腹部絞痛及腹瀉等腸胃症狀，伴隨嗜睡、盜汗、畏寒及倦怠等表徵；但嚴重者可能因脫水或電解質異常，導致休克、發紺、抽搐、昏迷及呼吸衰竭等症狀，甚至於死亡，治療上仍須小心謹慎。

行政院衛生署暨台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心

24 小時值班電話 02-28717121；自動傳真回覆系統 02-28742929


網址：<http://www.pcc.vghtpe.gov.tw/index.asp>



搖頭丸(MDMA)



神仙水(GHB)



雞肉絲菇(上圖)

綠褶菇(右上及右下)

